


Formy cięcia winorośli


Guyot

W formie cięcia guyot zwracamy uwagę na pędy najbliższe osi pnia, w okolicach jego zakończenia czyli głowy winorośli. Noworoczne latorośle – kolor zielony – stanowią odnawialne ramiona w następnym sezonie. Powinny one zostać zachowane w nienaganej jakości, jako najlepiej wykarmione oraz nie uszkodzone. Dobrze zdrewniałe jednoroczne pędy, po odcięciu ramienia przeginane są do poziomego układu wzdłuż poziomu drutu nośnego szpaleru. Zabieg formowania / odginania latorośli zaleca się wykonywać podczas rozpoczęcia wegetacji (marzec), kiedy do pęd przetwarza pierwsze soki i jego struktura jest podatna na gięcie - nie powodujące uszkodzenia tkanek wewnętrznych. Podczas wzrostu rośliny redukujemy młode latorośle poprzez ich wyłamywanie. Najkorzystniej wykonywać zabieg jeśli poziom wzrostu nie przekracza 5-10cm – zabieg wykonujemy ręcznie bez użycia narzędzi.



Cordon

Forma Cordon charakteryzuje się pozostawieniem stałego ramienia wzdłuż drutu nośnego. Tniemy jedynie łoży jednoroczne poprzez ich skrócenie do 2 pąków licząc od poziomego ramienia (zielony zakres łoży z rysunku). Pozostała część jest usuwana. Łozy początkowe podczas kształtowania formy powinny wyrastać bezpośrednio z ramienia ku górze. Odrosty boczne oraz dolne likwidujemy poprzez wyłamywanie, zapewniając optymalny przepływ soków w winorośli. Podczas cięcia ważne aby jego kierunek był przeciwny od pąków, tak aby podczas rozpoczęcia wegetacji i tzw. płaczu łoży soki nie zalały pozostawionych pąków. Z pozostawionych pąków po cięciu dajemy możliwość wzrostu maksymalnie 1 do 2 nowych odrostów na każdą pozostawioną łożę, zachowując zasadę maksymalnie 10 łoż na ramię. Ramię można odnawiać co 6-10 lat na nowe.



Informacje ogólne

Pozostawiamy jedynie latorośle wyrastające z górnych pąków, tak aby ograniczyć ich ilość do 8- 10 na jedno ramię w rozstawie między sobą o około 20cm (długość sekatora), zapewniając tym samym optymalny przewiew. Ilość ramion jest zależna od rozstawu krzewów w rzędzie. Ograniczenie ilości tóż noworocznych – na których będziemy mieli w danym roku owoce – pozwoli roślinie na dobre wykarmienie winogron, koncentrację cukrów oraz odpowiednie przygotowanie się do zimy poprzez odpowiednie zdrewnienie tóż. Jeśli krzewy są w odległości do 1 metra, zaleca się prowadzenie formę na jednym ramieniu, natomiast jeśli rozstaw przekracza 1 metr, można zwiększyć ilość ramion do 2. Rozstaw krzewów jest zależny podczas planowania nasadzeń i dobierany indywidualny w zależności od zasobności i klasy gleby oraz wigoru odmiany. W systemie dwuramiennym jest także możliwość prowadzenia rośliny na podwójnym pniu, które będzie posiadało swoje ramię – decyzja jednego bądź dwóch pni zależy indywidualnie od osoby prowadzącej uprawę winorośli.